

Immunothérapie

LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS...

Types de cancer du poumon	Recommandations
<p>Épidermoïde ou non Sans biomarqueurs positifs</p>	<p>Pembrolizumab en monothérapie en traitement de première ligne en cas de surexpression du PD-L1 Chimiothérapie standard en cas d'expression faible du PD-L1.</p>
<p>Avec surexpression du PD-L1</p>	<p>Nivolumab en monothérapie, pembrolizumab ou atézolizumab en traitement de deuxième ligne après une chimiothérapie première, si aucune immunothérapie n'a été faite</p>
<p>Sans surexpression de PD-L1 ou de statut inconnu</p>	<p>Nivolumab ou atézolizumab en traitement de seconde ligne. Patients ayant reçu une immunothérapie en première intention : chimiothérapie standard. Patients ne pouvant pas recevoir d'immunothérapie après une chimiothérapie : docétaxel en traitement de deuxième ligne ; pémétréxed en cas de cancer du poumon non épidermoïde.</p>
<p>Avec mutation activatrice de l'EGFR et une progression de la maladie après un traitement de première intention par inhibiteur d'EGFR</p>	<p>Avec mutation <i>T790M</i> : osimertinib En l'absence de mutation <i>T790M</i> : chimiothérapie</p>
<p>Avec un réarrangement du gène <i>ROS1</i></p>	<p>Crizotinib En cas de traitement préalable par crizotinib : chimiothérapie</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-respiratoire-oral/cancers-poumon/traitements/l-immunotherapie.html/>