

# Cancer du cavum (rhinopharynx et UCNT)

## TRAITEMENT EN FONCTION DU STADE

Stades	Options habituelles
I - IIa	Radiothérapie 70 Gy centrée sur le nasopharynx
Stades IIB, III, IVA, IV B	3 cycles chimiothérapie néoadjuvante espacés de 21 jours : Carcinome malpighien kératinisant Cisplatine : 25 mg/m <sup>2</sup> de J1 à J4 5-FU : 1 g/m <sup>2</sup> de J1-J4 ou radio chimiothérapie concomitante par cisplatine : 100 mg/m <sup>2</sup> à J1, J22 et J43, suivi par 3 cycles de cisplatine : 80 mg/m <sup>2</sup> + 5 FU : 1 g/m <sup>2</sup> de J1-J4 Carcinome indifférencié Bléomycine : 15 mg IV J1 puis 12 mg/m <sup>2</sup> IV de J1-J5 Epirubicine : 70 mg/m <sup>2</sup> J1 Cisplatine : 100 mg/m <sup>2</sup> J1

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-respiratoire-ork/cancers-de-la-t-te-et-du-cou/le-cancer-du-cavum-rhinopharynx-et-ucnt.html/>