

Dépistage

LE RÉSULTATS DES ÉTUDES DE DÉPISTAGE PUBLIÉES

Etude	Enseignements
ELCAP	<p>31 567 fumeurs > 40 ans Scanner + examen des crachats 484 cancers dépistés soit 1,5 % : 412 au stade IA soit 85 % et 88 % en vie à 10 ans</p>
Étude japonaise	<p>1 611 fumeurs de 40 à 80 ans Radio pulmonaire ou scanner spiralé + examen des crachats 14 cancers diagnostiqués lors de la sélection 22 cancers dépistés soit 1,4 % dont 80 % au stade IA</p>
<u>NSLT</u>	<p>53 456 gros fumeurs de 55 et 74 ans 3 examens par scanner spiralé à faible dose ou 3 clichés radiographiques standards Groupe "scanner" : 1060 cancers vs. groupe "radio standard" : 941 cancers Réduction de la mortalité de 13 % (intervalle de confiance 95 de 3 à 23 %) dans le groupe "scanner"</p>
NELSON (2020)	<p>13 195 hommes et 2 594 femmes âgés de 50 à 74 ans Scanner des poumons à T0, années 1, 3, et 5 ou absence de screening - Suivi minimum de 10 ans 2.1 % de nodules suspects Réduction de la mortalité sans augmentation importante des examens complémentaires sur des lésions suspectes Nombre de sujets à dépister pour diminuer un décès par cancer du poumon à 10 ans est de 135 (Intervalle de Confiance 95 % 76–532)</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-respiratoire-ori/cancers-poumon/depistage-et-prevention/le-depistage.html/>