

Cancers basocellulaires

LES FORMES DE LA MALADIE

Sous-types	Caractéristiques
Nodulaire	Papule ou nodule lisse, translucide, grisâtre et télangiectasies constituant la lésion élémentaire ou perle. La lésion croît progressivement et atteint une taille variable avec une périphérie faite de succession de perles. Le plus souvent sur la tête et le cou de sujets âgés
Superficiel	Localisé essentiellement sur le tronc ou sur les membres Plaque rouge plane, bien limitée, à extension très lentement centrifuge. Elle est parfois recouverte de petites squames ou de croûtes. Les perles caractéristiques ne sont en règle générale pas visibles à l'œil nu Peut être multiple d'emblée. Il prédomine en zone de peau couverte.
Sclérodermique	Variété rare souvent localisée près des orifices sur la face Plaque dure, brillante, mal limitée et déprimée et qui ressemble à une cicatrice blanche. Elle évolue lentement de façon centrifuge. Les limites de la tumeur sont très difficiles à préciser. Cette lésion peut rester longtemps méconnue et finir par être très étendue.
Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus	Variante rare habituellement localisée sur le bas du dos Nodule unique ou multiple, discrètement érythémateux, lisse, relativement ferme et parfois pédiculé Peut survenir plusieurs années après une radiothérapie

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-de-la-peau/les-cancers-basocellulaires.html/>