

Stades de la maladie

CLASSIFICATION DE ANN ARBOR VERSUS CELLE DE MURPHY

Stades	Ann Arbor	Murphy
I	Atteinte d'une seule aire ganglionnaire (I) ou atteinte localisée d'un seul site extra-ganglionnaire (IE)	Masse tumorale extra-ganglionnaire ou aire ganglionnaire unique à l'exclusion du médiastin ou de l'abdomen
II	Atteinte de deux ou plusieurs aires ganglionnaires du même côté du diaphragme ou atteinte extra-ganglionnaire unique avec une ou plusieurs aires ganglionnaires du même côté du diaphragme (IE)	Masse extra-ganglionnaire unique avec envahissement locorégional Deux masses extra-ganglionnaires isolées du même côté du diaphragme avec ou sans envahissement locorégional Masse gastro-intestinale primitive avec ou sans envahissement ganglionnaire mésentérique IIR = masse intra-abdominale entièrement réséquée

III	Atteinte ganglionnaire des deux côtés du diaphragme, pouvant aussi être accompagnée d'une atteinte extra-ganglionnaire localisée (IIIE) ou splénique (IIIS) ou des deux (IIISE)	Deux masses extra-ganglionnaires isolées de part et d'autre du diaphragme Toute masse intrathoracique primitive (médiastinale, pleurale ou thymique) Toute masse paraspinale ou épidurale quelle que soit la présence d'autres sites Deux ou plus de deux aires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme Stade IIIA = masse intra-abdominale non entièrement résécable Stade IIIB = maladie intra-abdominale disséminée
IV	Atteinte viscérale disséminée associée ou non à une atteinte ganglionnaire	Tout stade si envahissement du SNC ou de la moelle osseuse (un envahissement > 25 % définit une leucémie aiguë)
A=Absence de signe clinique d'évolutivité ; B=Présence d'un syndrome inflammatoire ; X=Présence d'une masse E= Présence d'une atteinte viscérale de contiguïté		

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/hemopathies-malignes-cancers-du-sang/maladie-de-hodgkin/formes-de-la-maladie/les-differents-stades.html/>