

Transition cancer non invasif à invasif

DEVENIR DES LÉSIONS PRÉ-CANCÉREUSES

Type	Prévalence (%)	Taux de progression vers un cancer (%)	Passage de pré-cancer à un cancer invasive (années)
Sein (DCIS)	10	20–25	10
Polypes coliques	24	15–25	5–15
Pancréas (PanIN)	43	10–15	8
Kystes pancréatiques	3–15	<1	10
Kératose actinique	49	10	25–30
Nodules pulmonaires	17–53	<5	2
BPCO	6	8.9 fumeurs 3.42 ancien fumeurs	20–50
Prostate	9	10–12	10–15

Type	Prévalence (%)	Taux de progression vers un cancer (%)	Passage de pré-cancer à un cancer invasive (années)
Barrett œsophage	0.5–2	6–9	1–3
Vessie (CIS)	4.6	10	0.5–1
Leucoplasie de la bouche	0.3–4.1	5–36 selon le type	3–10
Col (CIN I, CIN II/III)	50 (CIN I), 4 (CIN II) 37 (CIN III)	1 (CIN I) 4–24 (CIN II/III)	9–13 5–15
Lymphocytose bénigne	0.6% population générale 14–18% en cas d'antécédents de LLC	1.1% progression vers une LLC	10% à 10 ans 20% à 20 ans
MGUS	3–5% population générale >13% population à haut risque	1% par an	10% à 10 ans 20% à 20 ans
Myélome latent	0.5% population générale	10% par an	50% dans les 5 ans après 3%
CHIP*	1% < 40 ans 10–20% plus de 70 ans	0.5–1% risque de progression vers un lymphome B	5–10% dans les 10 ans 20% dans les 20 ans